



BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



ZEYTİN SİNEĞİ ZARAR ŞEKLİ

Zeytin sineği larva döneminde, meyve etinde zarar oluşturur. Larva gelişme süresinde çekirdek etrafında galeriler açarak beslenir.

Meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına doğrudan yağda asitlik değerinin yükselmesine neden olur.

Zarar oranı normal yıllarda %15-30 salgın yıllarda ise % 80'e kadar ulaşmaktadır. Yılda % 30'a kadar ürün kaybına sebep olduğu tahmin edilmektedir.

Özellikle sofralık zeytinlerde zararı daha büyük önem taşımaktadır. Zeytin sineği ülkemizde zeytin yetiştirilen tüm alanlarda görülür.

ZEYTİN SİNEĞİ İLE MÜCADELE İÇİN ÜRETİCİ OLARAK NE YAPMALIYIM



- 1- Pupalardan yok edilmesi için kış aylarında toprağın hafif işlenmesi gerekmektedir. (zeytin sineği kış aylarını pupa halinde toprağın 2-5 cm altında geçirir)
- 2- Tarım ve orman ilçe müdürlükleri tarafından zeytin sineği mücadelesi ilanından sonra (ağustos, eylül, ekim) zeytin bahçelerinde dökülen kurtlu zeytinler toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Bu uygulama bir sonraki yıl zeytin sineği popülasyonunu düşürmek için önemlidir.
- 3- Hava şartlarından dolayı, havadan ilaçlamanın yapılamadığı ya da geç kalacağı düşünüldüğünde, üretici olarak yerden ilaçlama yapılmalıdır.
- 4- Üretici zeytin bahçesinde zeytin sineğini gözlemlediğinde tarım ve orman ilçe müdürlüğü yetkililerine haber vermelidir.
- 5- Üretici olarak zeytin bahçesinde periyodik olarak vuruk sayımı yapılmalı, risk olarak değerlendirildiğinde tarım ve orman ilçe müdürlüğü yetkililerine haber verilmelidir.
- 6- Sineğin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde havadan ilaçlama destekleyici olarak imkanı olan çiftçilerimiz yerden ilaçlama yapmalı ya da tuzaklar asması gerekmektedir.



Zeytin,
Hayat
Kaynağıdır.



balikesirbld balikessirbld balikesirbld

www.balikesir.bel.tr



blkkirsal bacembalikesir

kirsal@balikesir.bel.tr

